

VITARIS ZINPHOS

MACRONUTRIENTES

FICHA TÉCNICA

FERTILIZANTE AGRÍCOLA

Fósforo (P₂O₅)	400 g/L
Zinc (ZnO)	170 g/L
Potasio (K₂O)	20 g/L
Formulación	Concentrado soluble (SL)
Formulador	Aris Industrial S.A.
Procedencia	Perú

BENEFICIOS

- Favorece al desarrollo rápido y vigoroso de los cultivos.
- Funciona como un excelente enraizante.
- Apporte directo de energía a la planta.
- Contiene Bio A Complex.
- Cumple con el reglamento UE, sobre metales pesados.

APLICACIONES

VITARIS ZINPHOS puede aplicarse tanto de manera foliar como en aplicaciones al suelo, pudiendo ser estas vías drench o vía sistema de riego.



Imagen referencial.

Cultivo	Dosis		Momento de aplicación
	L/Ha	L/200L	
Ají, pimiento, rocoto	1 - 2	0.5 - 0.75	Aplicar 15 días después del trasplante o con las primeras 5 hojas verdaderas para siembra directa. Hacer 1 aplicación después de cada cosecha para mejorar el vigor.
Alcachofa	1 - 2	0.5	Aplicar 20 días después del trasplante y 7 días después del cambio de surco.
Arroz	-	0.5 - 0.75	1 a 2 aplicaciones distribuidas entre 15 y 45 días después del trasplante.
Ajo y cebolla	1 - 2	0.5	1 a 2 aplicaciones distribuidas entre el trasplante y 30 días después del mismo.
Frijol y vainita	-	0.5	1 a 2 aplicaciones antes de la floración, distanciadas 10 días entre sí, desde 15 días después de la siembra.
Maíz	-	0.5 - 1	Aplicar en V3 y V6.
Palto, mango, olivo, arándanos y granada	2 - 4	0.5 - 0.75	Aplicar 3 a 5 días desde el brotamiento, repetir a los 7 días y a inicio de floración.
Limón, tangelo, naranja y mandarina	2 - 4	0.5 - 0.75	Después de la poda y lavado. A la cuaja de los frutos.
Papa	-	0.5	15 días antes de la tuberización.

VITARIS ZINPHOS

MACRONUTRIENTES

FICHA TÉCNICA

FERTILIZANTE AGRÍCOLA

Cultivo	Dosis		Momento de aplicación
	L/200L	L/Ha	
Vid	0.5 - 0.75	2 - 4	Cuando el brote tiene entre 5 y 15 cm, 15 días antes de floración y en post cosecha.
Café y cacao	-	0.5 - 1	Después de la poda, a la cuaja de frutos, después de cada cosecha.

Las dosis por hectárea son para aplicación foliar, en el caso se desee hacer la aplicación vía fertiriego se recomienda aumentar la dosis de la tabla en un 20% y si la aplicación se realizará vía drench el incremento de esta deberá ser del 50%.

PRESENTACIONES

1L y 20L.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP
(Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 27/12/2024 | Fecha de revisión: 16/10/2025
Versión: 03